


Administration de BUCCOLAM : instructions pour les patients, parents et accompagnants

Après le retrait du capuchon rouge de la seringue de BUCCOLAM, l'embout interne blanc peut parfois rester fixé à la seringue (comme le montre la Figure 2 ci-dessous). Si cela se produit, l'embout risque de tomber dans la bouche du patient et d'être inhalé voir avalé. Dans ce cas, il y aurait un risque d'étouffement pour le patient.

Vous pouvez continuer à utiliser BUCCOLAM comme votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien vous l'a indiqué, mais vous devez suivre les instructions ci-dessous :

1. Avant d'administrer BUCCOLAM, assurez-vous que le capuchon rouge est retiré et vérifiez que l'embout interne blanc est fixé au capuchon rouge, comme le montre la Figure 1 ci-dessous.
2. Assurez-vous que l'embout interne blanc ne reste pas fixé sur la seringue, comme le montre la Figure 2.
3. Si l'embout interne blanc reste fixé sur la seringue, vous devez le retirer manuellement avant l'administration pour éviter qu'il tombe dans la bouche du patient.

Si vous pensez que l'embout interne blanc est tombé dans la bouche du patient, n'insérez pas votre doigt dans la bouche pour le retirer. A la place, tournez le patient sur le côté (position latérale de sécurité) et assurez-vous qu'il le recrache.



Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou à votre infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement sur le site <http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.