

Bleu patente V sodique 2,5%, 25 mg/mL Ampoule 2 mL	LazuLymph Bleu patenté V 2,5% 25 mg/mL Seringue 2 mL	Infracyanine 25 mg/10 mL Flacon 25 mg (poudre) Ampoule 10 mL (solvant)	Carmyne 40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	Carmin d'Indigo Provindo 40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	Provendo 0,8% 40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	Indigo Carmin 1% Flacon 10 mL	Provedye 0,5 % 10 mg/2 mL Ampoule (2 mL) remplacée par le flacon (2 mL)	Blue Marker 1% 10 mg/mL Flacon 1 mL	MethyBlue 1% 10 mg/mL Seringue 5 mL	
Guerbet	S.A.L.F / AlaVia MEDS	Serb	Serb	Provepharm	Provepharm	Derm-Tech	Provepharm	Aguettant	S.A.L.F / AlaVia MEDS	
Bleu patenté	Vert d'indocyanine				Indigotine - Carmin d'indigo - Indigo carmine			Bleu de méthylène		
Médicament	Dispositif Médical	Médicament	Médicament	Médicament	Dispositif Médical	Dispositif Médical	Ampoule remplacée par le flacon Dispositif Médical	Dispositif Médical	Dispositif Médical	
Voies d'administration										
Sous-cutanée péritumorale ou périaréolaire	Intra- artérielle	Voie subdermique, intradermique, périaréolaire, péritumorale ou intratumorale	Sous-cutanée	Intraveineuse directe selon l'indication en ophtalmologie, hépatologie et cardiologie	Administration intraveineuse lente	Pulvérisation locale en surface de la muqueuse gastro-intestinale ou sur une lésion ciblée	Pulvérisation sur la zone à étudier	Administration locale Ne pas injecter par voie IV, intrathécale, intra-amniotique ou intraoculaire	Voie intra-vésicale, Voie rectale, Voie sous cutanée locale, Voie intra utérine, Dans l'orifice du kyste pilonidal	
		Ne pas injecter par voie IV				Ne pas injecter par voie IV			Ne pas utiliser par voie intraveineuse, intrathécale, intraoculaire et orale	
									Ne pas injecter par voie IV, intrathécale ou intra-amniotique	
Indications										
Repérage du ganglion sentinelle avant la biopsie chez les patientes ayant un cancer du sein opérable	Repérage des territoires artériels	Recherche intra opératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du sein	Repérage peropératoire du ganglion sentinelle et visualisation des voies lymphatiques en cas de cancer du sein	En ophtalmologie : L'étude des vaisseaux choroidiens par angiographie oculaire en infrarouge, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMA), la myopie dégénérative et les autres causes de néo vascularisation choroidiennes En hépatologie : La détermination du débit sanguin hépatique et de la réserve fonctionnelle hépatique par des tests de clairance En cardiologie : La mesure du volume sanguin circulant et du débit cardiaque	Détection peropératoire des complications urétérales suspectées au cours de la chirurgie abdomino-pelvienne	Marqueur pour l'endoscopie gastro-intestinale, en tant qu'aide à la visualisation des irrégularités topographiques et à la visualisation des lésions polyplioides ou planes, y compris les adénomes	Détection des anomalies des muqueuses (ulcérations, fissures, irrégularités de surface) et marquage de tumeurs ou de lésions	Marqueur pour visualisation chirurgicale, telles que le test d'étanchéité des sutures, la visualisation des fuites, le repérage d'un trajet fistuleux en peropératoire et la visualisation du ganglion sentinelle en chirurgie oncologique	Aide à la visualisation lors de procédures chirurgicales : Délimitation des tissus et des pièces opératoires, (repérage cavité rénale, trajet fistuleux urinaire ou colique, kyste pilonidal, marquage du futur orifice d'une stomie), Test d'étanchéité des sutures urinaires et colorectales, Evaluation de la perméabilité tubaire	Aide à la visualisation lors de procédures chirurgicales telles que la délimitation des tissus et des pièces opératoires Evaluation de la perméabilité tubaire (gynécologie) Repérage du ganglion sentinelle lors de la chirurgie du cancer du sein Identification de la cavité rénale lors d'une intervention chirurgicale ou d'une néphrolithotomie percutanée Identification des fistules urinaires ou coliques avant chirurgie Marquage du sinus pilonidal avant chirurgie Marquage pré opératoire de stomie avant excision Vérification de l'étanchéité des sutures des voies urinaires et colorectales
Repérage des vaisseaux lymphatiques		Recherche inter opératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du côlon à un stade précoce								
		Identification pré opératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le mélanome								

Indications et voie d'administration des différents colorants utilisés au bloc opératoire (non substituables entre eux)

D'après [Actualité - Erreurs d'identification de colorants utilisés au bloc opératoire : des rappels et un poster pour sécuriser leur administration - ANSM](#) (08.12.2025)

Pour les mises en garde et précautions d'emploi, merci de consulter la totalité du tableau sur le site de ANSM